

【糖尿病 注射製剤一覧】

2025.9現在

【超速効型インスリン製剤】

No.1

	製品名	一般名	薬価(円)	作用発現時間	最大時間	作用持続時間	用法	備考
ノボ	フィアスプ注 	インスリニアスパルト	フレックスタッチ 1529 ペンフィル 1030 バイアル 2780	5~15分	1~3時間	3~5時間	食事開始 2分以内~ 食事開始時	食事開始後投与 の場合は、食事 開始20分以内
	ノボラピッド注 	インスリニアスパルト	フレックスペン 1293 ペンフィル 897 バイアル 1990 フレックスタッチ 1380	10~20分	1~3時間	3~5時間	毎食直前	
リリー	ルムジェブ注 	インスリニスプロ	ミリオペン 1305 ミリオペンHD 1305 カート 1115 バイアル 2580	—	—	—	食事開始 2分以内~ 食事開始時	食事開始後投与 の場合は、食事 開始20分以内
	ヒューマログ注 	インスリニスプロ	ミリオペン 1156 ミリオペンHD 1156 カート 968 バイアル 2240	15分未満	30分~1.5時間	3~5時間	毎食直前 (15分以内)	
サノフィ	アピドラ注 	インスリングルリジン	ソロスター 994 カート 797 バイアル 1630	15分未満	30分~1.5時間	3~5時間	毎食直前 (15分以内)	
	インスリニスプロBS注HU「サノフィ」 	インスリニスプロ	ソロスター 876 カート 408 バイアル 1370	15分未満	30分~1.5時間	3~5時間	毎食直前 (15分以内)	
	インスリニアスパルトBS注NR「サノフィ」 	インスリニアスパルト	ソロスター 1248 カート 689 バイアル 2130	10~20分	1~3時間	3~5時間	毎食直前	

【速効型インスリン製剤】

	製品名	一般名	薬価(円)	作用発現時間	最大時間	作用持続時間	用法	備考
ノボ	ノボリンR注 	生合成ヒト中性インスリン 	フレックスペンバイアル 1167 バイアル 2540	約30分	1~3時間	約8時間	毎食前30分	
リリード	ヒューマリンR注  	ヒトイヌリン 	ミリオペンカートバイアル 1174 874 2320	30~1時間	1~3時間	5~7時間	毎食前30分	

【持効型溶解インスリン製剤】

	製品名	一般名	薬価(円)	作用発現時間	最大時間	作用持続時間	用法	備考
ノボ	トレシーバ注  	インスリン デグルデク	フレックスタッチ ペンフィル 1841 1356	該当なし	明らかな ピークなし	>42時間	1日1回	
	レベミル注  	インスリン デテミル	フレックスタッチ ペンフィル 1424 1155	約1時間	3~14時間	約24時間	1日1回 夕食前or就寝前	
	アヴィクリ注  	インスリン イコデク	フレックスタッチ 2081	該当なし	2~4日	1週間超	1週間1回 定着状態まで 3~4週間かかる	
サンファイ	ランタス注  	インスリン グラルギン	ソロスター カート バイアル 1049 881 2590	1~2時間	明らかな ピークなし	約24時間	1日1回 朝食前or就寝前	
	ランタスXR注 	インスリン グラルギン	ソロスター 1910	1~2時間	明らかな ピークなし	約24時間超	1日1回 時刻は毎日一定 450単位/3ml	
リリー	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」  	インスリングラルギン	ミリオペン カート 1041 685	1~2時間	明らかな ピークなし	約24時間	1日1回 朝食前or就寝前	
富士ルーム	インスリングラルギンBS注キット「FFP」 	インスリングラルギン	キット 1041	1~2時間	明らかな ピークなし	約24時間	1日1回 朝食前or就寝前	

【中間型インスリン】

No.3

	製品名	一般名	薬価(円)	作用発現時間	最大時間	作用持続時間	用法	備考
ノボ	ノボリンN注 	生合成ヒトイソフェン インスリン	フレックスペン 1297	約1.5時間	4~12時間	約24時間	1日1~2回 朝食前30分以内	1日2回の場合 朝夕食前
リリーオ	ヒューマリンN注 	ヒトイインスリン	ミリオペン カート バイアル 1255 929 2710	1~3時間	8~10時間	18~24時間	1日1~2回 朝食前30分以内	

【持効型溶解インスリン・GLP-1受容体作動薬 配合製剤】

	製品名	一般名	薬価(円)	作用発現時間	最大時間	作用持続時間	用法	備考
ノボ	ゾルトファイ配合注 	インスリン デグルテク /リラグルチド	フレックススタッチ 4207	—	—	—	1日1回	300ドース/3ml
サンファイ	ソリクア配合注 	インスリン グラルギン /リキシセナチド	ソロスター 4723	—	—	—	1日1回朝食前	300ドース/3ml

【混合型インスリン製剤】


	製品名	一般名	薬価(円)	作用発現時間	最大時間	作用持続時間	用法	備考
ノボ	ノボラピッド30ミックス注 	二相性プロタミン 結晶性インスリン アスパルト	フレックスペン 1445 1083 ペンフィル	10~20分	1~4時間	約24時間	1日2回食直前 朝夕食直前	1日1回の場合 朝食直前
	ノボラピッド50ミックス注 	二相性プロタミン 結晶性インスリン アスパルト	フレックスペン 1416	10~20分	1~4時間	約24時間	1日2回食直前 朝夕食直前	1日1回の場合 朝食直前
	ノボリン30R注 	生合成ヒトイソフェン インスリン	フレックスペン 1339	約30分	2~8時間	約24時間	1日2回食前 朝夕食前30分以内	1日1回の場合 朝食直前
リリーオ	ヒューマログミックス25注 	インスリン リスプロ 混合製剤-25	ミリオペン カート 1226 988	15分未満	0.5~6時間	18~24時間	1日2回食前 朝夕食前15分以内	1日1回の場合 朝食直前
	ヒューマログミックス50注 	インスリン リスプロ 混合製剤-50	ミリオペン カート 1156 968	15分未満	30~4時間	18~24時間	1日2回食前 朝夕食前15分以内	1日1回の場合 朝食直前
	ヒューマリン3/7注 	ヒトイソフェン インスリン 	ミリオペン カート バイアル 1305 925 3070	30分~1時間	2~12時間	18~24時間	1日2回食前 朝夕食前30分以内	1日1回の場合 朝食直前

【配合溶解インスリン製剤】

No.4

	製品名	一般名	薬価(円)	作用発現時間	最大時間	作用持続時間	用法	備考
ノボ	ライゾデグ配合注 	インスリン デグルデク インスリン アスパルト	フレックスタッチ 1670	10~20分 (Bolus画分)	1~3時間 (Bolus画分)	>42時間 (Basal画分)	1日1~2回 主たる食事の直前 or朝夕食直前	超速効型： 持効型 = 3:7

【ペンとカートリッジの種類】

ノボ	ノボペン6  	    	リリー	ヒューマペンサビオ     	※ うぐいす色・銀色は販売中止 ラグジェラHD (0.5単位刻み) ※販売中止 	      				
サノフイ	イタンゴ  	   								

【グルカゴン製剤】 ※ 低血糖時の救急処置 バクスミ一点鼻粉末剤

薬価(円)


8368円

(保険適用可)







【GLP-1受容体作動薬】

No.5

	製品名	一般名	薬価(円)	作用発現時間	最大時間	作用持続時間	用法	備考
ノボ	ビクトーザ皮下注18mg 	リラグルチド	8434 (18mg/1キット)	—	—	—	1日1回 朝or夕 0.3~1.8mg/回	
	オゼンピック皮下注2mg 		11151 (2mg/1キット)	—	—	—	1週間1回	同一曜日に投与
リリ	トルリシティ皮下注0.75mg 	デュラグルチド	2749 (0.75mg/1キット)	—	—	—		同一曜日に投与
	トルリシティ皮下注1.5mg 		5498 (1.5mg/1キット)	—	—	—	1週間1回	

【持続性GIP/GLP-1受容体作動薬】

	製品名	一般名	薬価(円)	作用発現時間	最大時間	作用持続時間	用法	備考
リリ	マンジャロ皮下注2.5mg 	チルゼバチド	1924	—	—	—	1週間1回	同一曜日に投与
	マンジャロ皮下注5mg 		3848	—	—	—	1週間1回	同一曜日に投与
	マンジャロ皮下注7.5mg 		5772	—	—	—	1週間1回	同一曜日に投与
	マンジャロ皮下注10mg 		7696	—	—	—	1週間1回	同一曜日に投与
	マンジャロ皮下注12.5mg 		9620	—	—	—	1週間1回	同一曜日に投与
	マンジャロ皮下注15mg 		11544	—	—	—	1週間1回	同一曜日に投与